




BESCHRIJVING

N-xt K is een geconcentreerd vloeibaar product op basis van kalium (K), 100% oplosbaar in water voor het toedienen van nutriënten aan gewassen. Voorkomt en corrigeert kaliumgebrek.

N-xt K

VLOEIBARE
BLAD-
BEMESTING



Kalium voor bladbemesting

VOORDELEN

Kalium (K) bevordert:

De opbrengst door een verbetering van de groeisnelheid en het caliber.

De kwaliteit: door een hoger suikergehalte (°brix)
door een mooiere kleur (anthocyanen en carotenen)
door een betere schilkwiteit (celwanden)
door een verbeterde aanmaak van suikers (zetmeel)

N-xt K is een product dat speciaal ontwikkeld is om de antagonismen met de in hard water aanwezige Ca^{++} en Mg^{++} -ionen te voorkomen. Op die manier verhoogt de doeltreffendheid van de kaliumbemesting.

N-xt K kan volkomen veilig worden toegepast omdat het geen chloor, zwavel of stikstof in de vorm van nitraat of ammoniak bevat.

SAMENSTELLING

Kalium (K_2O)	462 g/l (31 % g/g)	
Totale stikstof (N) in de vorm van ureum g/g)		45 g/l (3 %

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

<input type="checkbox"/> Vorm	Vloeibaar
<input type="checkbox"/> Kleur	Transparant
<input type="checkbox"/> Dichtheid	1,5
<input type="checkbox"/> pH	12,5

VERPAKKING

Bus van 20 liter - pallet van 960 liter
Vat van 210 liter - pallet van 840 liter

EG MESTSTOF



N-xt K

AANBEVOLEN DOSERING

Grondtoepassingen : Alle teelten aan 50L/ha vóór het planten.

Bladbehandelingen :

- Bieten:** 5-10L/ha in het 10-15 bladstadium.
Niet meer behandelen na het dichtgroeien van de rijen .
- Graangewassen:** 4 L/ha tussen het laatste bladstadium en de aarvorming.
- Mais:** 4 L/ha in het 5-6 bladstadium.
- Aardappelen:** 4 x 5 L/ha na het sluiten van de rijen, gedurende de knolvorming.
- Prei:** 5 x 3-4 L/ha gedurende het hele groeiproces.
Gebruik de hoogste dosis voor de herfstproductie.
- Wortelen:** 3 x 5 L/ha vanaf het 10 bladstadium
en gedurende het hele groeiproces.
- Koolteelt:** 3 x 4-5 L/ha vanaf het 6 bladstadium
en gedurende het hele groeiproces.
- Uien - Sjalotten:** 4 x 3 L/ha tussen begin van de bolvorming en begin droging.
- Spinazie:** 3 x 2-3 L/ha alle 10 dagen vanaf het sluiten van de rijen.
4-5 x 2-3 L/ha tijdens de korte dag periodes.
- Gras (gazon):** 15 L/ha eind september-begin oktober,

Minimum 150 liter water per ha gebruiken

MENGBAARHEID

Mengbaar met de meeste soorten kunstmest en gangbare gewasbeschermingsmiddelen. Wilt u producten mengen, voer dan eerst een test uit. Niet meer dan twee producten mengen. Voor maximale doeltreffendheid, de behandeling uitvoeren wanneer het blad droog is. Na de behandeling mag het gewas 3 à 4 uur niet blootgesteld worden aan regen zodat het product optimaal kan opgenomen worden. Voor meer informatie neem gerust contact op met uw adviseur.



VLOEIBARE BLADBEMESTING

Kalium voor bladbemesting



Eerste Bokslootweg 17
7821 AT Emmen
The Netherlands



Sapac NV – Div. Tradecorp International
Louizalaan 500 B-1050 Brussel

www.tradecorp.eu